

# ศัตรูของมังคุด และวิธีป้องกัน

โรคและแมลงศัตรูมังคุด	ลักษณะการทำลาย	ผลิตภัณฑ์แนะนำ
 <b>เพลี้ยอ่อน</b>	เพลี้ยไฟจะดูดกินน้ำเลี้ยงจากยอดอ่อน ดอกอ่อน และผลอ่อนของมังคุด หากเป็นยอดอ่อนจะทำให้ยอดแห้ง แต่หากเป็นดอกอ่อนและผลอ่อน จะทำให้ดอกกร้าง	 <b>เม็กทาร์</b> หรือ  <b>200 ซีซี.</b>
 <b>หนอนขอนใบ</b>	หนอนจะกินอยู่ใต้ผิวและเห็นเป็นทางสีขาวคดเคี้ยวไปมา ในมังคุดที่ถูกทำลายจะหงิกงอไม่เจริญเติบโตและแห้งตายในเวลาต่อมา	 <b>พินคอป 200</b> หรือ  <b>200 ซีซี.</b>
 <b>โรคใบจุด</b> Leaf Spot	ใบจะเป็นจุดแผลสีเทา ขนาดและรูปร่างไม่แน่นอน ขอบแผลมีสีน้ำตาลเข้ม แผลเก่าจะเป็นผงหรือเม็ดเล็กๆ สีดำกระจายอยู่กลางแผล	 <b>ไฮโรซอน</b> <b>200 ซีซี.</b>
 <b>เพลี้ยไฟ(ระยะติดผล)</b>	เพลี้ยไฟจะดูดกินน้ำเลี้ยงของดอกอ่อน ทำให้ผลมีรอยสีน้ำตาลกร้าน และร่วงหล่นในที่สุด	 <b>เม็กทาร์</b> หรือ  <b>200 ซีซี.</b>
 <b>เพลี้ยไฟ(ระยะขยายผล)</b>	ดูดกินน้ำเลี้ยงจากผลอ่อนของมังคุดทำให้ผลมีรอยสีน้ำตาลกร้านหลุดร่วงได้ง่าย ผิวไม่สวยขายไม่ได้ราคา	 <b>เม็กทาร์</b> หรือ  <b>200 ซีซี.</b>
 <b>เพลี้ยแป้ง</b>	เพลี้ยแป้งเป็นแมลงปากดูดมักเกาะอยู่กับที่ โดยมีมดดำเป็นพาหะดูดกินน้ำเลี้ยงบริเวณกลีบเลี้ยง	 <b>ฟิลด์ดอกซ์ พลัส</b> <b>200 ซีซี.</b>
 <b>โรคราดำ</b>	เกิดจากเพลี้ยแป้งถ่ายมูลออกมา และเกิดราดำขึ้นบนมูลของเพลี้ยแป้งถ้าเกิดที่ผลทำให้บริเวณผลสกปรก	 <b>ไฮโรซอน</b> <b>200 ซีซี.</b>

บริษัท โปรเจ็คฟิลด์ จำกัด  
 605/27-28 ซ.ลาดพร้าว87 แยก21 ถ.ลาดพร้าว  
 แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์ เขตวังทองหลาง กทม.10310  
 โทร. 02-791-2999



เกษตรปลอดภัย ก้าวไปกับโปรเจ็คฟิลด์



# มังคุด

เทคนิคการเพิ่มผลผลิต มังคุดคุณภาพ



**Metalosate**  
**เมทัลโลสแต มัลติมินเนอรัล**  
**MULTIMINERAL**

ผู้จำหน่าย : บริษัท โปรเจ็คฟิลด์ จำกัด  
 605/27-28 ซ.ลาดพร้าว 87 แยก 21 ถ.ลาดพร้าว แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์ เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

ผลิตภัณฑ์คุณภาพจาก บริษัท อัลเมียน แลบบอราทอรีส์ อิงค์, ประเทศสหรัฐอเมริกา



ทุกอัตราแนะนำผสมน้ำ 200 ลิตร

ก่อนแตกใบอ่อน	1 เดือนก่อนออกดอก	เริ่มออกดอก (แทงช่อดอก)	ก่อนดอกบาน	ติดผล	ขยายขนาดผล	ก่อนเก็บเกี่ยว
ฉีดพ่น 1-2 ครั้ง ต่อการแตกใบอ่อน 1 ชุด	ฉีดพ่น 1-2 ครั้ง ห่างกัน 7-10 วัน	ฉีดพ่น 2-3 ครั้ง ห่างกัน 10-14 วัน	ฉีดพ่น 1-2 ครั้ง ห่างกัน 7-10 วัน	ฉีดพ่น 1-2 ครั้ง ห่างกัน 7-10 วัน	ฉีดพ่น 1-2 ครั้ง ห่างกัน 7-10 วัน	พ่นให้ทั่วทรงพุ่ม 2-3 ครั้ง ห่างกัน 10 วัน
<b>ครีอพ-อัฟ</b> อัตรา 100 ซีซี. + <b>เอ็มแซด</b> อัตรา 50 ซีซี.	<b>ครีอพ-อัฟ</b> อัตรา 100 ซีซี. + <b>แมกนีเซียม</b> อัตรา 50 ซีซี.	<b>ทรอปปิคอล</b> อัตรา 100 ซีซี. + <b>ซิงค์</b> อัตรา 50 ซีซี. + <b>โบรอน</b> อัตรา 50 ซีซี.	<b>ทรอปปิคอล</b> อัตรา 100 ซีซี. + <b>เอ็มแซด</b> อัตรา 50 ซีซี.	<b>มัลติมิเนอรัล</b> อัตรา 100 ซีซี. + <b>โบรอน</b> อัตรา 50 ซีซี.	<b>มัลติมิเนอรัล</b> อัตรา 100 ซีซี. + <b>แคลเซียม</b> อัตรา 50 ซีซี. + <b>โพแทสเซียม</b> อัตรา 50 ซีซี.	<b>โพแทสเซียม</b> อัตรา 100 ซีซี. + <b>แมงกานีส</b> อัตรา 50 ซีซี.
เร่งการแตกใบอ่อนเพิ่ม เพิ่มความสมบูรณ์ของใบ	เพิ่มการสะสมอาหาร เพื่อการออกดอก	กระตุ้นให้เกิดการออกดอก อย่างสม่ำเสมอ	ช่วยการผสมเกสร ลดการหลุดร่วง	กระตุ้นการสร้างเนื้อ เพิ่มการติดผล	ขยายขนาดผล เพิ่มน้ำหนัก	เร่งการเข้าสีเก็บไว้ ได้ราคา

ครีอพ-อัฟ (Crop-up)	ทรอปปิคอล (Tropical)	มัลติมิเนอรัล (Multimineral)	แมงกานีส (Manganese)	แมกนีเซียม (Magnesium)	โบรอน (Boron)	แคลเซียม (Calcium)	โพแทสเซียม (Potassium)
<ul style="list-style-type: none"> <li>เร่งการแตกใบและราก</li> <li>เพิ่มความสมบูรณ์ของต้นพืช</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ช่วยพัฒนาดอกและผสมเกสร</li> <li>เพิ่มการติดดอก</li> <li>ลดปัญหาการผลัดใบอ่อนเมื่อโดนฝน</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ป้องกันการขาดธาตุอาหาร</li> <li>สะสมอาหารเร็วพร้อมออกผล</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>เพิ่มวิตามิน</li> <li>เพิ่มกลิ่นหอม</li> <li>เร่งสี เร่งโต</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>เร่งการสังเคราะห์แสง</li> <li>ใบเขียวเข้ม</li> <li>ผลโตเต็มที่</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>เร่งการแตกใบและราก</li> <li>ช่วยเพิ่มความสมบูรณ์เพศติดผลมากขึ้น</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ลดปัญหาผลแตก</li> <li>ขั้วเหนียว</li> <li>ลดการหลุดร่วง</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>เพิ่มความหวาน</li> <li>สร้างเนื้อ</li> <li>เพิ่มน้ำหนัก</li> </ul>